



Ce que vous devez savoir sur la

TRICHOMONASE (TRICH)

Qu'est-ce que la trichomonase :

- La trichomonase, communément appelée « Trich », est une infection sexuellement transmissible très courante (IST) causée par une infection par trichomonas vaginalis (un parasite protozoaire)²
- La recherche montre que les femmes autochtones au Canada ont certains des taux les plus élevés de Trich, la prévalence étant d'environ 10,1 % par rapport à 3,8 % dans la population générale³
- Les taux de trichomonase peuvent être plus élevés chez les femmes autochtones au Canada en raison des effets durables de la colonisation, des obstacles à l'accès aux soins et des inégalités systémiques.
- **La plupart des gens n'ont aucun symptôme (70 % – 85 %)**³
- La trichomonase est transmise par des rapports sexuels non protégés, le partage de jouets sexuels et tout échange de fluides corporels¹
- Symptômes (apparaissent généralement 5 à 28 jours après l'exposition) :¹
 - ↳ Démangeaison ou brûlure
 - ↳ Gonflement ou rougeur écoulement anormal (odeur, couleur ou quantité inhabituelle)
 - ↳ Douleur lors de la miction, les rapports sexuels peuvent être inconfortables.
 - ↳ Si vous avez subi une chirurgie inférieure, les symptômes peuvent sembler différents.

Complications :

Si elle n'est pas traitée, la trichomonase peut entraîner :

- Risque d'obtenir et de transmettre le VIH⁵
- Infertilité⁵
- Irritation et inconfort génitaux persistants

Comment traiter la trichomonase :



- Pour traiter la trichomonase, vous devez prendre des antibiotiques comme prescrit par le fournisseur de soins de santé¹
- Consultez une infirmière ou un médecin pour une ordonnance¹
- Si vous êtes enceinte, informez votre fournisseur de soins de santé, la trichomonase peut augmenter le risque d'accouchement prématuré et de faible poids à la naissance, il est donc important d'obtenir les bons soins⁴
- Partenaire traitement : Tous les partenaires sexuels des deux derniers mois devraient être testés et traités, même s'ils n'ont pas de symptômes¹
- Les cliniques de santé peuvent aider à notifier les partenaires de manière anonyme si nécessaire.

AFAC Recommandations /Appels à l'action :

Nous appelons à :

- Un meilleur accès aux services de réduction des méfaits dans les établissements correctionnels, où les taux d'infection sont élevés.
- Augmentation de l'éducation et plus de soutien culturel
- Un meilleur accès aux tests et aux traitements dans les établissements correctionnels où les maladies se propagent rapidement en raison du manque de tests, des transferts entre établissements et des barrières systémiques.
- La trichomonase peut avoir des effets durables sur la santé s'il n'est pas traité, en particulier pour les femmes, et augmente le risque d'acquérir et de transmettre le VIH – en particulier dans les milieux carcéraux.

Pourquoi cela a un impact sur les femmes autochtones incarcérées :

Racisme systémique • Surincarcération • Obstacles aux soins de santé • Stigmatisation

Plaidoyer :

Nous avons besoin de :

- Davantage de cliniques mobiles dans les régions rurales et éloignées
- Soins culturellement sécuritaires et sans jugement pour les femmes et les personnes de genre divers autochtones.

RÉFÉRENCES :

1. [cdc.gov/trichomoniasis/about/index.html](https://www.cdc.gov/trichomoniasis/about/index.html)
2. nccid.ca/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/incarceration-and-STBBI_2021_Full_ST-edits.pdf
3. macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/27165/1/Paliwal_Lshita_2021.pdf
4. [healthline.com/health/pregnancy/infections-trichomoniasis](https://www.healthline.com/health/pregnancy/infections-trichomoniasis)
5. bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/trichomoniasis